

COITUS INTERRUPTUS

Conoce más sobre esta práctica anticonceptiva



#noDoubts

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

Características del método:



Perfiles de mujeres para los que está indicado el método:



1 ¿Qué es?

Este método, conocido también como **“marcha atrás”**, consiste en evitar que el espermatozoides sea eyaculado dentro de la vagina o sobre la vulva durante las relaciones sexuales. Es necesario que, justo antes de la eyaculación el hombre retire el pene de la vagina, manteniendo el semen alejado de las zonas genitales externas femeninas.

Con el **uso típico** (uso real, que incluye el uso inconsistente o incorrecto), **22 de cada 100 mujeres** tuvieron un embarazo no deseado durante el primer año y **4 de cada 100 mujeres** con el uso perfecto (utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso) de esta práctica.

2 ¿Cómo actúa?

Mediante el coitus interruptus se evita que el espermatozoides eyaculado penetre en la vagina durante las relaciones sexuales.

3 ¿Cómo se usa?

Durante las relaciones sexuales, el hombre retira su pene de la vagina y lo aleja de los genitales externos de la mujer antes de la eyaculación. Puede resultar complicado y ambos debéis ser cuidadosos ya que, justo antes de la eyaculación, se libera una cantidad de fluido del pene que contiene espermatozoides.

4 ¿Quién puede utilizarlo?

Cualquier persona puede utilizar este método. No tiene contraindicaciones médicas.

5 Ventajas

- Es un método que no contiene hormonas.
- No requiere acudir a la consulta ni prescripción médica.
- Está disponible en todo momento.

6 Advertencias y precauciones

- No es un método fácil y requiere mucho autocontrol.
- Depende de que el hombre sea capaz de retirarse en el momento adecuado.
- **Es una práctica con alto riesgo**, incluso si el hombre se retira a tiempo, puede ocurrir embarazo.

No te protege frente a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) ni frente al VIH/SIDA.

PUEDES INFORMARTE SOBRE TODOS LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN:

anticonceptivos **hoy**
.com












Consulta con tu médico antes de empezar cualquier método anticonceptivo. Sólo él puede aconsejarte cuál es el método más indicado para ti.

El contenido que se proporciona en esta literatura es información general. En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de su médico.

Algunas de las especificaciones mencionadas pueden variar dependiendo de la marca del producto.

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. / Josefa Valcárcel, 38 · 28027 Madrid. www.msds.es Copyright © 2019 Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. Todos los derechos reservados.

COMPARATIVA DE MÉTODOS

		ACCIÓN ANTICONCEPTIVA*	USO	VIA ADMINISTRACIÓN	MÉTODO HORMONAL	PROTECCIÓN FRENTE A ETS
COITUS INTERRUPTUS		78,00 %	Al tener relaciones	N/A	X	X
IMPLANTE		99,95 %	3 años	Subcutánea	✓	X
ESTERILIZACIÓN MASCULINA		99,85 %	Permanente	Quirúrgica	X	X
DIU HORMONAL		99,80 %	3-5 años	Intrauterina	✓	X
ESTERILIZACIÓN FEMENINA		99,50 %	Permanente	Quirúrgica	X	X
DIU DE COBRE		99,20 %	5-10 años	Intrauterina	X	X
INYECCIÓN ANTICONCEPTIVA		94,00 %	Cada 12 semanas	Intramuscular	✓	X
ANILLO VAGINAL		91,00 %	Cada 4 semanas	Vaginal	✓	X
PÍLDORA COMBINADA		91,00 %	Díaria	Oral	✓	X
PÍLDORA SIN ESTRÓGENOS		91,00 %	Díaria	Oral	✓	X
PARCHE		91,00 %	Semanal	Cutánea	✓	X
DIAFRAGMA		88,00 %	Al tener relaciones	Vaginal	X	X
PRESERVATIVO MASCULINO		82,00 %	Al tener relaciones	Sobre el pene	X	✓
PRESERVATIVO FEMENINO		79,00 %	Al tener relaciones	Vaginal	X	✓
CONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD		76,00 %	Díaria	N/A	X	X
ESPERMICIDA		72,00 %	Al tener relaciones	Vaginal	X	X

*Datos de la Organización Mundial de la Salud que indican el porcentaje de mujeres que no se quedaron embarazadas durante el primer año con el uso real del método, que incluye su uso inconsciente o incorrecto. N/A: no aplica.