


ESTERILIZACIÓN FEMENINA


Conoce más sobre este método anticonceptivo



#noDoubts

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

Características del método:



Perfiles de mujeres para los que está indicado el método:



1 ¿Qué es?

Es un método anticonceptivo intencionado que proporciona una **protección permanente o de por vida contra el embarazo**. La reversión no es posible normalmente. Implica un examen físico y cirugía.

Consiste en hacer una **ligadura de las trompas de Falopio o en bloquear dichas trompas**.

Con este método anticonceptivo, **0,5 de cada 100** mujeres tuvieron un embarazo no deseado durante el primer año.

2 ¿Cómo actúa?

Las **trompas de Falopio están bloqueadas o cortadas** y el óvulo liberado desde los ovarios no puede desplazarse por ellas, lo que **impide la unión del óvulo con el espermatozoide**.

3 ¿Cómo es el procedimiento?

Existen varias formas de bloquear las trompas de Falopio:

a) Ligación de las trompas de Falopio:

- **Laparoscopia:** con anestesia general, el médico realizará una pequeña incisión en el abdomen y pinzará, quemará o extraerá las trompas de Falopio.
- **Minilaparatomía:** A través del abdomen mediante una incisión similar a la cesárea el ginecólogo puede acceder a las trompas de Falopio para pinzar o extraerlas.

b) Oclusión de las trompas de Falopio:

La oclusión es un procedimiento permanente donde un micro inserto se coloca en cada una de las trompas. Los micro insertos funcionan con tu cuerpo formando una barrera natural que impide que los espermatozoides alcancen los ovarios evitando el embarazo.

- **Histeroscopia:** utilizando solo anestesia local, el ginecólogo colocará micro insertos en tus trompas de Falopio a través de la vagina. Este método tarda 3 meses en ser efectivo.

ESTERILIZACIÓN FEMENINA

Conoce más sobre este método anticonceptivo



#noDoubts

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

4 ¿Quién puede utilizarlo?

La esterilización es bien tolerada en todas las mujeres.

- Mujeres que tienen o no hijos.
- Mujeres jóvenes.
- Mujeres que han dado a luz (en los últimos 7 días).
- Mujeres en periodo de lactancia.
- Mujeres que conviven con VIH, con o sin tratamiento antirretroviral.

5 Ventajas

- Es un método anticonceptivo permanente.
- Una vez que sea efectiva no tienes que utilizar un método anticonceptivo nunca más.
- No tiene hormonas.
- No interfiere en tus relaciones sexuales.
- No afecta a la funcionalidad sexual.
- Es un procedimiento sencillo.
- Si el parto ocurre por cesárea y siempre que la madre haya expresado por escrito su consentimiento para la realización de la ligadura de trompas, esta se puede realizar en el mismo acto.

6 Advertencias y precauciones

- Si el parto ocurre por vía vaginal, se prefiere demorar la intervención al menos seis semanas.
- Se necesitan entre cuatro semanas y al menos tres meses para que la esterilización sea efectiva, dependiendo del método utilizado.
- Como en otras cirugías menores, la esterilización conlleva algunos riesgos propios de la cirugía, como infección o abscesos en el lugar de la incisión.
- Es un método definitivo e irreversible.

No te protege frente a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) ni frente al VIH/SIDA.

PUEDES INFORMARTE SOBRE TODOS LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN:

anticonceptivos**ho**y
.com

Consulta con tu médico antes de empezar cualquier método anticonceptivo. Sólo él puede aconsejarte cuál es el método más indicado para ti.

El contenido que se proporciona en esta literatura es información general. En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de su médico.

Algunas de las especificaciones mencionadas pueden variar dependiendo de la marca del producto.

COMPARATIVA DE MÉTODOS

ACCIÓN ANTICONCEPTIVA*

USO

VIA ADMINISTRACIÓN

MÉTODO HORMONAL

PROTECCIÓN FRENTE A ETS

ESTERILIZACIÓN FEMENINA



99,50 %

Permanente

Quirúrgica

X

X

IMPLANTE



99,95 %

3 años

Subcutánea

✓

X

ESTERILIZACIÓN MASCULINA



99,85 %

Permanente

Quirúrgica

X

X

DIU HORMONAL



99,80 %

3-5 años

Intrauterina

✓

X

DIU DE COBRE



99,20 %

5-10 años

Intrauterina

X

X

INYECCIÓN ANTICONCEPTIVA



94,00 %

Cada 12 semanas

Intramuscular

✓

X

ANILLO VAGINAL



91,00 %

Cada 4 semanas

Vaginal

✓

X

PÍLDORA COMBINADA



91,00 %

Diaria

Oral

✓

X

PÍLDORA SIN ESTRÓGENOS



91,00 %

Diaria

Oral

✓

X

PARCHE



91,00 %

Semanal

Cutánea

✓

X

DIAFRAGMA



88,00 %

Al tener relaciones

Vaginal

X

X

PRESERVATIVO MASCULINO



82,00 %

Al tener relaciones

Sobre el pene

X

✓

PRESERVATIVO FEMENINO



79,00 %

Al tener relaciones

Vaginal

X

✓

COITUS INTERRUPTUS



78,00 %

Al tener relaciones

N/A

X

X

CONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD



76,00 %

Diaria

N/A

X

X

ESPERMICIDA



72,00 %

Al tener relaciones

Vaginal

X

X

*Datos de la Organización Mundial de la Salud que indican el porcentaje de mujeres que no se quedaron embarazadas durante el primer año con el uso real del método, que incluye su uso inconsciente o incorrecto. N/A: no aplica.

anticonceptivos **hoy** .com

Consulta con tu médico antes de empezar cualquier método anticonceptivo. Sólo él puede aconsejarte cuál es el método más indicado para ti.

El contenido que se proporciona en esta literatura es información general. En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de su médico.

Algunas de las especificaciones mencionadas pueden variar dependiendo de la marca del producto.

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. / Josefa Valcárcel, 38 - 28027 Madrid. www.msds.es Copyright © 2019 Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. Todos los derechos reservados.