

ESTERILIZACIÓN MASCULINA

Conoce más sobre este método anticonceptivo



#noDoubts

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

Características del método:



Perfiles de mujeres para los que está indicado el método:



1 ¿Qué es?

Es un método anticonceptivo **permanente** que consiste en un **procedimiento quirúrgico sencillo** y que conlleva un riesgo bajo, llamado **vasectomía**. Dado que es permanente esta opción es para aquellos hombres que han decidido que o no quieren tener más hijos o no quieren hijos.

Con la **esterilización masculina 0,10 de cada 100** mujeres se quedaron embarazadas sin desearlo durante el primer año.

2 ¿Cómo actúa?

Se bloquean o cierran los vasos deferentes, lo que implica que el semen no contiene espermatozoides. El semen es eyaculado, pero al no contener espermatozoides, no puede causar embarazo.

3 ¿Cómo es el procedimiento?

Este procedimiento se realiza cortando y sellando o ligando los conductos deferentes, que son las vías que llevan el espermatozoide desde los testículos al pene.

El procedimiento se realiza mediante anestesia local. A través de una punción o una pequeña incisión en el escroto, el médico corta los conductos deferentes y corta o bloquea los extremos mediante cauterización. La punción en el escroto es muy pequeña y la operación dura unos 10-15 minutos.


4 ¿Quién puede utilizarlo?

La vasectomía es un procedimiento que conlleva un bajo riesgo para cualquier hombre.

- Hombres que quieren un método anticonceptivo permanente.
- Si buscas un método que no interfiera en las relaciones sexuales.
- Hombres que deseen un método sencillo y que no requiera seguimiento médico (además de análisis de semen).
- Si buscas un método que no afecte a la funcionalidad sexual.

ESTERILIZACIÓN MÁSCULINA

Conoce más sobre este
método anticonceptivo



#noDoubts

Tú decides cuándo empieza
cada etapa de tu vida.

5 Ventajas

- Conlleva un bajo riesgo, es permanente y cómodo.
- Produce menos efectos secundarios que muchos de los métodos anticonceptivos para mujeres.

6 Advertencias y precauciones

- No es un proceso que sea fácilmente reversible.
- Puede haber ciertas molestias en la zona del escroto que normalmente duran de 2 a 3 días.
- Tarda 3 meses en ser efectivo (tú o tu pareja debéis utilizar preservativo u otro método anticonceptivo durante los 3 meses posteriores a la operación).

No te protege frente a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) ni frente al VIH SIDA.

PUEDES INFORMARTE SOBRE TODOS LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN:

anticonceptivos**hoy**
.com

Consulta con tu médico antes de empezar cualquier método anticonceptivo. Sólo él puede aconsejarte cuál es el método más indicado para ti.

El contenido que se proporciona en esta literatura es información general. En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de su médico.

Algunas de las especificaciones mencionadas pueden variar dependiendo de la marca del producto.

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. C/ Josefa Valcárcel, 38 · 28027 Madrid. www.msd.es Copyright © 2019 Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. Todos los derechos reservados.

COMPARATIVA DE MÉTODOS

ACCIÓN ANTICONCEPTIVA*

USO

VIA ADMINISTRACIÓN

MÉTODO HORMONAL

PROTECCIÓN FRENTE A ETS

ESTERILIZACIÓN MASCULINA



99,85 %

Permanente

Quirúrgica

X

X

IMPLANTE



99,95 %

3 años

Subcutánea

✓

X

DIU HORMONAL



99,80 %

3-5 años

Intrauterina

✓

X

ESTERILIZACIÓN FEMENINA



99,50 %

Permanente

Quirúrgica

X

X

DIU DE COBRE



99,20 %

5-10 años

Intrauterina

X

X

INYECCIÓN ANTICONCEPTIVA



94,00 %

Cada 12 semanas

Intramuscular

✓

X

ANILLO VAGINAL



91,00 %

Cada 4 semanas

Vaginal

✓

X

PÍLDORA COMBINADA



91,00 %

Diaria

Oral

✓

X

PÍLDORA SIN ESTRÓGENOS



91,00 %

Diaria

Oral

✓

X

PARCHE



91,00 %

Semanal

Cutánea

✓

X

DIAFRAGMA



88,00 %

Al tener relaciones

Vaginal

X

X

PRESERVATIVO MASCULINO



82,00 %

Al tener relaciones

Sobre el pene

X

✓

PRESERVATIVO FEMENINO



79,00 %

Al tener relaciones

Vaginal

X

✓

COITUS INTERRUPTUS



78,00 %

Al tener relaciones

N/A

X

X

CONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD



76,00 %

Diaria

N/A

X

X

ESPERMICIDA



72,00 %

Al tener relaciones

Vaginal

X

X

anticonceptivos **hoy**.com

Consulta con tu médico antes de empezar cualquier método anticonceptivo. Sólo él puede aconsejarte cuál es el método más indicado para ti.

El contenido que se proporciona en esta literatura es información general. En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de su médico.

Algunas de las especificaciones mencionadas pueden variar dependiendo de la marca del producto.

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. / Josefa Valcárcel, 38 - 28027 Madrid. www.msd.es Copyright © 2019 Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. Todos los derechos reservados.