

# INYECCIÓN

Conoce más sobre este método anticonceptivo




#noDoubts

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

## Características del método:



## Perfiles de mujeres para los que está indicado el método:



## 1 ¿Qué es?

Es un método anticonceptivo reversible que contiene solo progesterina, similar a la hormona natural de la mujer.

Con el **uso típico** (uso real, que incluye el uso inconsistente o incorrecto) de la inyección, **6 de cada 100 mujeres** tuvieron un embarazo no deseado durante el primer año de uso, y **0,2 de cada 100 mujeres** con el **uso perfecto** (utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso) de este método.

## 2 ¿Cómo actúa?

La inyección anticonceptiva **evita la maduración de los óvulos durante el ciclo menstrual y la ovulación**. Al impedir que los óvulos maduren y salgan de los ovarios, el espermatozoide no llega a fertilizar los óvulos y, por tanto, no se produce el embarazo. Además, espesa la mucosidad del cérvix o cuello uterino dificultando el avance del espermatozoide y hace que el revestimiento del útero sea más delgado. De esta forma, se reduce la probabilidad de que en el útero se implante el óvulo en el caso de que llegase a fertilizarse.

## 3 ¿Cómo se usa?

La inyección de depósito de acetato de medroxiprogesterona **debe ser administrada mediante inyección intramuscular profunda cada 12 semanas**. Siempre y cuando la inyección se realice en los cinco días después de estas 12 semanas, no se necesitan medidas anticonceptivas adicionales.

## 4 ¿Quién puede utilizarlo?

- Mujeres con o sin hijos.
- Mujeres que hayan sufrido un aborto (siempre que no haya sido aborto diferido).
- Mujeres en periodo de lactancia, desde la semana 6 tras el parto.
- Mujeres que conviven con VIH, con o sin tratamiento antirretroviral.

## 5 Ventajas

- Anticonceptivo de larga duración, reversible.
- No interfiere en las relaciones sexuales.
- No contiene estrógenos.
- No se ve afectado en caso de vómitos y/o diarrea, ni con el uso de antibióticos comunes.

## INYECCIÓN

Conoce más sobre este método anticonceptivo



#noDoubts

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

### 6 Advertencias y precauciones

**No se debe utilizar la inyección si:**

- Eres alérgica (hipersensible) a alguno de los componentes.
- Estás embarazada o sospechas que puedas estarlo.
- Tu médico te ha indicado que tienes o sospecha que tienes algún tumor en las mamas o en los genitales.
- Tus menstruaciones son anormales (bien de menos, bien de más) sin causa conocida.
- Tienes o has tenido una enfermedad de los vasos sanguíneos, como tromboflebitis (formación de coágulos en las venas, con inflamación dolorosa y calambres) o coágulos que obstruyen los vasos sanguíneos (fenómenos tromboembólicos).
- Tienes o has tenido enfermedad grave del hígado.

#### 6.1. Embarazo y lactancia



Informa a tu médico si estás o piensas que podrías estar embarazada, ya que no debes utilizar la inyección anticonceptiva durante el embarazo. Tu médico deberá comprobar que no estás embarazada antes de iniciar el tratamiento con la inyección anticonceptiva.

Es un método que **puedes utilizar mientras estás dando el pecho, a partir de la semana 6 postparto.**

### 7 Posibles efectos adversos

Los efectos adversos muy frecuentes, que pueden llegar a afectar a 1 de cada 10 mujeres, son:

- Desarreglos de la menstruación
- Dolor de cabeza
- Mareo, malestar, cansancio, dolor abdominal
- Cambios de peso
- Nerviosismo

**No te protege frente a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) ni frente al VIH/SIDA.**

PUEDES INFORMARTE SOBRE TODOS LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN:

anticonceptivos **hoy**  
.com

















Consulta con tu médico antes de empezar cualquier método anticonceptivo. Sólo él puede aconsejarte cuál es el método más indicado para ti.

El contenido que se proporciona en esta literatura es información general. En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de su médico.

Algunas de las especificaciones mencionadas pueden variar dependiendo de la marca del producto.

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. C/ Josefa Valcárcel, 38 - 28027 Madrid. www.msd.es Copyright © 2019 Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. Todos los derechos reservados.

# COMPARATIVA DE MÉTODOS

		ACCIÓN ANTICONCEPTIVA*	USO	VIA ADMINISTRACIÓN	MÉTODO HORMONAL	PROTECCIÓN FRENTE A ETS
INYECCIÓN ANTICONCEPTIVA		94,00 %	Cada 12 semanas	Intramuscular	✓	✗
IMPLANTE		99,95 %	3 años	Subcutánea	✓	✗
ESTERILIZACIÓN MASCULINA		99,85 %	Permanente	Quirúrgica	✗	✗
DIU HORMONAL		99,80 %	3-5 años	Intrauterina	✓	✗
ESTERILIZACIÓN FEMENINA		99,50 %	Permanente	Quirúrgica	✗	✗
DIU DE COBRE		99,20 %	5-10 años	Intrauterina	✗	✗
ANILLO VAGINAL		91,00 %	Cada 4 semanas	Vaginal	✓	✗
PÍLDORA COMBINADA		91,00 %	Diaria	Oral	✓	✗
PÍLDORA SIN ESTRÓGENOS		91,00 %	Diaria	Oral	✓	✗
PARCHE		91,00 %	Semanal	Cutánea	✓	✗
DIAFRAGMA		88,00 %	Al tener relaciones	Vaginal	✗	✗
PRESERVATIVO MASCULINO		82,00 %	Al tener relaciones	Sobre el pene	✗	✓
PRESERVATIVO FEMENINO		79,00 %	Al tener relaciones	Vaginal	✗	✓
COITUS INTERRUPTUS		78,00 %	Al tener relaciones	N/A	✗	✗
CONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD		76,00 %	Diaria	N/A	✗	✗
ESPERMICIDA		72,00 %	Al tener relaciones	Vaginal	✗	✗

\*Datos de la Organización Mundial de la Salud que indican el porcentaje de mujeres que no se quedaron embarazadas durante el primer año con el uso real del método, que incluye su uso inconsciente o incorrecto. N/A: no aplica.