


Inyección

Conoce más sobre este método anticonceptivo

ORGANON

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida



Características del método

94%
Acción anticonceptiva

Cada 12 semanas
Uso

Intramuscular
Vía de administración

Protección frente a ITS

Perfiles de mujeres

en los que es adecuado el método



Lactancia



Tabaquismo



Obesidad



Nulíparas



Migrañas



Hipertensión

¿Qué es?

Es un método anticonceptivo reversible que contiene solo progestina, similar a la hormona natural de la mujer.

6 de cada 100 mujeres sufrieron un embarazo no deseado durante el primer año de utilización con el **uso típico*** (uso real, que incluye el uso inconsistente o incorrecto) de la inyección, y **0,2 de cada 100 mujeres** con el uso perfecto (utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso).

¿Cómo actúa?

La inyección anticonceptiva **evita la maduración de los óvulos durante el ciclo menstrual y la ovulación**. Al impedir que los óvulos maduren y salgan de los ovarios, el espermatozoide no llega a fertilizar los óvulos y, por tanto, no se produce el embarazo.

¿Cómo se usa?

La inyección **debe ser administrada mediante inyección intramuscular profunda cada 12 semanas**. Siempre y cuando la primera inyección se realice dentro de los cinco primeros días del ciclo menstrual normal, con una periodicidad trimestral, no se necesitan medidas anticonceptivas adicionales.

¿Quién puede utilizarlo?


- Mujeres con o sin hijos.
- Mujeres que hayan sufrido un aborto (siempre que no haya sido aborto diferido).
- Mujeres en periodo de lactancia, desde la semana 6 tras el parto.
- Mujeres que conviven con VIH, con o sin tratamiento antirretroviral.

Puedes informarte **sobre todos los métodos anticonceptivos** en:

anticonceptivos**hoy**
.com

Inyección

Conoce más sobre este método anticonceptivo



ORGANON

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida

Ventajas

- Anticonceptivo de larga duración, reversible.
- No interfiere en las relaciones sexuales.
- No contiene estrógenos.
- No se ve afectado en caso de vómitos y/o diarrea, ni con el uso de antibióticos comunes.

Advertencias y precauciones

No se debe utilizar la inyección si:

- Eres alérgica (hipersensible) a alguno de los componentes.
- Estás embarazada o sospechas que puedas estarlo.
- Tu médico te ha indicado que tienes o sospecha que tienes algún tumor en las mamas o en los genitales.
- Tus menstruaciones son anormales (bien de menos, bien de más) sin causa conocida.
- Tienes o has tenido una enfermedad de los vasos sanguíneos, como tromboflebitis (formación de coágulos en las venas, con inflamación dolorosa y calambres) o coágulos que obstruyen los vasos sanguíneos (fenómenos tromboembólicos).
- Tienes o has tenido enfermedad grave del hígado.

Embarazo y lactancia

Informa a tu médico si estás o piensas que podrías estar embarazada, ya que no debes utilizar la inyección anticonceptiva durante el embarazo. Tu médico deberá comprobar que no estás embarazada antes de iniciar el tratamiento con la inyección anticonceptiva.


Es un método que **puedes utilizar mientras estás dando el pecho, a partir de la semana 6 postparto.**

Puedes informarte **sobre todos los métodos anticonceptivos** en:

anticonceptivos**hoy**
.com

Inyección

Conoce más sobre este método anticonceptivo



 ORGANON

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida

Posibles efectos adversos

Los efectos adversos muy frecuentes, que pueden llegar a afectar a 1 de cada 10 mujeres, son:

- Desarreglos de la menstruación
- Dolor de cabeza
- Mareo, malestar, cansancio, dolor abdominal
- Cambios de peso
- Nerviosismo


No te protege frente a las infecciones de transmisión sexual (ITS) ni frente a la infección por VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana).

Puedes informarte **sobre todos los métodos anticonceptivos** en:

anticonceptivos**hoy**
.com

Inyección

Conoce más sobre este método anticonceptivo



ORGANON

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida

Información sobre los métodos

Características de los métodos anticonceptivos

	Acción anticonceptiva*	Uso	Vía de administración	Método hormonal	Protección frente a ITS	
	Implante	99,95%	3 años	Subcutánea	✓	✗
	Esterilización masculina	99,85%	Permanente	Quirúrgica	✗	✗
	DIU hormonal	99,80%	3-8 años	Intrauterina	✓	✗
	Esterilización femenina	99,50%	Permanente	Quirúrgica	✗	✗
	DIU de cobre	99,20%	5-10 años	Intrauterina	✗	✗
	Inyección anticonceptiva	94,00%	Cada 12 semanas	Intramuscular	✓	✗
	Anillo vaginal	91,00%	Cada 4 semanas	Vaginal	✓	✗
	Píldora combinada	91,00%	Diaria	Oral	✓	✗
	Píldora de solo gestágeno	91,00%	Diaria	Oral	✓	✗
	Parche	91,00%	Semanal	Transdérmica	✓	✗
	Diafragma	88,00%	Al tener relaciones	Vaginal	✗	✗
	Preservativo masculino	82,00%	Al tener relaciones	Sobre el pene	✗	✓
	Preservativo femenino	79,00%	Al tener relaciones	Vaginal	✗	✓
	Coitus interruptus	78,00%	Al tener relaciones	N/A	✗	✗
	Conocimiento de la fertilidad	76,00%	Diaria	N/A	✗	✗
	Espermicida	72,00%	Al tener relaciones	Vaginal	✗	✗

* Datos de la Organización Mundial de la Salud que indican el porcentaje de mujeres que no se quedaron embarazadas durante el primer año con el uso típico del método, que incluye su uso inconsistente o incorrecto.

No se recomienda utilizar el método anticonceptivo de forma distinta a la descrita en las instrucciones de uso.

N/A: no aplica. ITS: Infecciones de transmisión sexual.

El contenido que se proporciona en esta literatura es información general.

En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de tu médico.