

# Implante hormonal

Conoce más sobre este método anticonceptivo

ORGANON

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida

## Características del método

99,95 % **Acción anticonceptiva**

3 años **Uso**

Subcutánea **Vía de administración**

 **Protección frente a ITS**

## Perfiles de mujeres

en los que es adecuado el método



Lactancia



Tabaquismo



Obesidad



Nulíparas



Migrañas



Hipertensión

## ¿Qué es?

El implante es un método anticonceptivo reversible de larga duración (LARC). Es una pequeña varilla de plástico, blanda, y flexible que libera una pequeña cantidad de progestágeno diariamente y se presenta precargado en un aplicador estéril desechable. Este método te puede **proteger del embarazo** durante un periodo de hasta tres años.

**0,05 de cada 100 mujeres** sufrieron un embarazo no deseado durante el primer año de utilización del anticonceptivo con el **uso típico\*** (uso real, que incluye el uso inconsistente o incorrecto) del método y **0,05 de cada 100 mujeres** con el **uso perfecto** (utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso).

## ¿Cómo actúa?

El principio activo, **etonogestrel** actúa de dos formas:

- Impide la liberación de un óvulo de los ovarios.
- Produce cambios en el cérvix que dificultan la entrada del semen en el útero.

## ¿Cómo se usa?

El implante debe ser **insertado y extraído únicamente por un profesional sanitario** que esté formado en el proceso de inserción y extracción.

El profesional sanitario decidirá contigo el momento más adecuado para la inserción. Esto depende de tu situación personal (por ejemplo, el método anticonceptivo que estás utilizando en la actualidad). A menos que cambies desde otro método anticonceptivo hormonal, **la inserción** se realizará los **días 1-5 de tu sangrado menstrual espontáneo**, para descartar un embarazo.




\*No se recomienda utilizar el método anticonceptivo de forma distinta a la descrita en las instrucciones de uso.

Puedes informarte **sobre todos los métodos anticonceptivos** en:

anticonceptivos**hoy**  
.com

# Implante hormonal

Conoce más sobre este método anticonceptivo



 ORGANON

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida

Antes de insertar o extraer el implante se te administrará anestesia local. El implante se inserta justo **bajo la piel**, en la **cara interna de la parte superior del brazo no dominante** (el que no utilizas para escribir).

**Tanto el profesional sanitario como tú, debéis ser capaces de palpar y notar el implante bajo la piel después de su colocación.**

Si no puedes palpar el implante inmediatamente después de la inserción, o en cualquier momento, puede que el implante no haya sido insertado o puede que haya sido insertado profundamente. Si tienes la más mínima duda, deberás usar un método anticonceptivo de barrera (por ejemplo, un preservativo) hasta que tu profesional sanitario y tú estéis completamente seguros de que el implante está insertado.

**El implante debe extraerse o sustituirse antes de que pasen 3 años desde la inserción.** Si deseas continuar usando el mismo método, se te podrá insertar en ese mismo momento un nuevo implante. Puedes pedirle a tu médico que te extraiga el implante en cualquier momento.

## ¿Quién puede utilizarlo?

- Mujeres que hayan tenido o no hijos.
- Mujeres de entre 18 y 40 años.
- Mujeres que han sufrido un aborto o un aborto espontáneo (en el plazo de los 5 días siguientes al aborto durante el primer trimestre del embarazo, y en el plazo de los días 21 siguientes en el segundo trimestre).
- Mujeres fumadoras de más de 35 años (hasta 40 años).
- Mujeres que padecen migraña con aura.
- Mujeres con obesidad.
- Mujeres que no pueden tomar estrógenos.
- Madres en periodo de lactancia (se puede insertar inmediatamente tras el parto).
- Mujeres que tienen o han tenido anemia.

## Ventajas


- Es un método reversible.
- Ofrece protección a largo plazo.
- Es un método discreto.

Puedes informarte **sobre todos los métodos anticonceptivos** en:

anticonceptivos**hoy**  
.com

# Implante hormonal

Conoce más sobre este método anticonceptivo



ORGANON

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida

- No requiere administración diaria.
- No interfiere en tus relaciones sexuales.
- No se ve afectado en caso de vómitos y/o diarrea, ni con el uso de antibióticos comunes.
- Puedes solicitar que un médico te extraiga el implante en el momento que lo desees.

## Advertencias y precauciones

**El implante no te protege frente a las infecciones de transmisión sexual (ITS) ni frente a la infección por VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana).**

No utilices un implante como método anticonceptivo si:

- Eres alérgica al principio activo o a alguno de los demás componentes de este medicamento.
- Sufres trombosis (coágulo de sangre en un vaso sanguíneo, por trombosis venosa profunda o embolia pulmonar).
- Padeces o tienes antecedentes de alteraciones hepáticas graves (hasta que los valores de la función hepática no se hayan normalizado).
- Has tenido cáncer de mama o de los órganos genitales o hay sospechas de que pudieras tenerlo.
- Tienes sangrados vaginales sin causa justificada.

## Embarazo y lactancia

No utilices el implante si estás embarazada o sospechas que puedes estarlo. Si tienes dudas sobre si estás embarazada deberás hacerte un test de embarazo antes de que te inserten el implante.

El implante puede utilizarse durante el periodo de lactancia. Aunque una pequeña cantidad del principio activo del implante pasa a la leche materna, no afecta a la producción o a la calidad de la leche materna, ni al crecimiento ni el desarrollo de los niños.

Si estás en período de lactancia, consulta a tu médico antes de utilizar este medicamento.




Puedes informarte **sobre todos los métodos anticonceptivos** en:

anticonceptivos**hoy**  
.com

# Implante hormonal

Conoce más sobre este método anticonceptivo



 ORGANON

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida

## Cambios en el patrón de sangrado menstrual

Al igual que con otros anticonceptivos que sólo contienen progestágeno, el patrón de tu sangrado menstrual puede cambiar durante el uso del implante. Puedes experimentar cambios en la frecuencia del sangrado (ausencia, disminución, sangrados más frecuentes o continuos), en la intensidad (disminución o aumento), o en la duración. 1 de cada 5 mujeres no tienen sangrado mientras que 1 de cada 5 mujeres experimentan sangrados frecuentes y/o prolongados. Ocasionalmente se han comunicado casos de sangrado intenso. Tu patrón de sangrado durante los tres primeros meses generalmente indica tu futuro patrón de sangrado.

Un cambio en el patrón de sangrado no significa que el implante no sea adecuado para ti o que no te proteja del embarazo. En general, no es necesario que tomes ninguna medida. Debes consultar a tu médico si el sangrado menstrual es intenso o prolongado.

Cuando el implante es retirado, el periodo vuelve a la normalidad.

## Uso del implante con otros medicamentos

**Informa siempre a tu médico sobre qué medicamentos o plantas medicinales estás utilizando.**

Algunos medicamentos:

- Pueden tener una influencia en los niveles de la hormona (progestágeno) en sangre.
- Pueden hacer que sea menos efectivo en la prevención del embarazo.
- Pueden causar sangrados inesperados.

## Posibles efectos adversos

Si experimentas cualquier tipo de efecto adverso, consulta a tu médico, farmacéutico o enfermero.

Los efectos adversos muy frecuentes que pueden afectar a más de 1 de cada 10 mujeres son:


- Acné.
- Dolor de cabeza.
- Aumento del peso corporal.
- Dolor en las mamas.
- Sangrado irregular.
- Infección en la vagina.

**Puedes informarte sobre todos los métodos anticonceptivos en:**

anticonceptivos**hoy**  
.com

# Implante hormonal

Conoce más sobre este método anticonceptivo



ORGANON

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida

## Información sobre los métodos

## Características de los métodos anticonceptivos

	Acción anticonceptiva*	Uso	Vía de administración	Método hormonal	Protección frente a ITS	
	Implante	99,95%	3 años	Subcutánea	✓	✗
	Esterilización masculina	99,85%	Permanente	Quirúrgica	✗	✗
	DIU hormonal	99,80%	3-8 años	Intrauterina	✓	✗
	Esterilización femenina	99,50%	Permanente	Quirúrgica	✗	✗
	DIU de cobre	99,20%	5-10 años	Intrauterina	✗	✗
	Inyección anticonceptiva	94,00%	Cada 12 semanas	Intramuscular	✓	✗
	Anillo vaginal	91,00%	Cada 4 semanas	Vaginal	✓	✗
	Píldora combinada	91,00%	Diaria	Oral	✓	✗
	Píldora de solo gestágeno	91,00%	Diaria	Oral	✓	✗
	Parche	91,00%	Semanal	Transdérmica	✓	✗
	Diafragma	88,00%	Al tener relaciones	Vaginal	✗	✗
	Preservativo masculino	82,00%	Al tener relaciones	Sobre el pene	✗	✓
	Preservativo femenino	79,00%	Al tener relaciones	Vaginal	✗	✓
	Coitus interruptus	78,00%	Al tener relaciones	N/A	✗	✗
	Conocimiento de la fertilidad	76,00%	Diaria	N/A	✗	✗
	Espermicida	72,00%	Al tener relaciones	Vaginal	✗	✗

\* Datos de la Organización Mundial de la Salud que indican el porcentaje de mujeres que no se quedaron embarazadas durante el primer año con el uso típico del método, que incluye su uso inconsistente o incorrecto.

No se recomienda utilizar el método anticonceptivo de forma distinta a la descrita en las instrucciones de uso.

N/A: no aplica. ITS: Infecciones de transmisión sexual.

**El contenido que se proporciona en esta literatura es información general.**

**En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de tu médico.**